

## PODANČICE - gliste



Podančice so majhne, približno centimeter velike gliste, belkaste barve, ki živijo v prebavilih človeka. Med glistami so najpogostejše povzročiteljice okužb, predvsem pri otrocih. Človek se okuži, ko zaužije jajčeca podančice, ki so lahko na rokah, predmetih, igračah, prahu...

<p><b>ZNAKI OKUŽBE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- močan srbež okrog zadnjika, zlasti ponoči,</li> <li>- nemirno spanje,</li> <li>- bolečine v trebuhu, slabost in bruhanje,</li> <li>- tretjina okuženih nima znakov okužbe.</li> </ul> <p>Kadar se pojavi močan srbež okrog zadnjika, se svetuje obisk zdravnika.</p>	<p><b>PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kratko postrizeni nohti,</li> <li>- pogosto umivanje rok z milom in vodo,</li> <li>- vsakodnevno prhanje (ne kopanje),</li> <li>- dnevna menjava spodnjega perila, pogosta menjava posteljnega perila, pranje oblačil in perila nad 55°C,</li> <li>- izogibanje praskanja okrog zadnjika,</li> <li>- zdravljenje oseb okuženih s podančico in njihovih družinskih članov.</li> </ul>	<p><b>RAZVOJNI KROG PODANČICE</b></p>
<p><b>ZDRAVLJENJE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s protimikrobnimi zdravili v dveh odmerkih,</li> <li>- predpiše jih zdravnik.</li> </ul>	<p>Z vidika kužnosti pri glstavosti ni omejitev za vključitev otroka v vrtec. Dolžnost staršev je, da o pojavu glstavosti pri otroku, obvestijo vzgojno osebje.</p>	